



Пневмококковая инфекция

это множество различных тяжелых заболеваний, вызываемых наиболее опасными видами пневмококков




Провоцирующие факторы:

переохлаждение, переутомление, постоянный стресс, снижение иммунитета, хронические заболевания и наличие вредных привычек.

Группы риска:

- Часто и длительно болеющие дети в возрасте до 5 лет.
- Взрослые старше 65 лет.
- Люди, страдающие с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, с болезнями печени, хронической почечной недостаточностью, болезнями крови, с иммунодефицитными состояниями.



Пневмококковая инфекция передается при чихании, кашле, во время разговора с больным человеком.

Симптомы заболевания:

- ⇒ острое, внезапное начало,
- ⇒ повышение температуры, озноб,
- ⇒ кашель в первые дни обычно сухой, затем появляется мокрота, которая чаще носит слизисто-гнойный или гнойный характер,
- ⇒ появление болей в грудной клетке при дыхании, одышка,
- ⇒ интоксикация (слабость, головная боль, общие симптомы недомогания).

Профилактика пневмококковой инфекции


- ежегодная вакцинация, особенно групп риска.
- прекращении контакта с больным человеком,
- мытье рук,
- ежедневная влажная уборка, проветривание,
- ведение здорового образа жизни.

Ни в коем случае не заниматься самолечением это очень опасно! При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.



Пневмококковая инфекция

является одной из бактериальных инфекций человека. Тяжелее это заболевание протекает у детей первых лет жизни и у пожилых. При ослаблении защитных свойств организма и снижении иммунитета, пневмококковая инфекция, попадая в верхние дыхательные пути бурно размножается и вызывает всевозможные заболевания.



По статистике до 70% всех пневмоний, около 25% отитов, 5-15% менингитов и 3% эндокардитов вызываются пневмококком.

Симптомы заболевания:

- ⇒ острое, внезапное начало,
- ⇒ повышение температуры, озноб,
- ⇒ кашель в первые дни обычно сухой, затем появляется мокрота,
- ⇒ появление болей в грудной клетке при дыхании, одышка,
- ⇒ интоксикация (слабость, головная боль),
- ⇒ общие симптомы недомогания.

Осложнения пневмококковой инфекции опасны для жизни больного, так как высока степень летальности, единственным способом защиты является вакцинопрофилактика.

Вакцинация — наиболее эффективная мера профилактики пневмококковой инфекции.

Проводится детям и взрослым из групп риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится:

- *детям в возрасте от 2 до 5 лет,*
- *взрослым, относящимся к группе риска старше 60 лет, у которых имеются хронические заболевания органов дыхания,*
- *призывникам,*
- *лицам старшего трудоспособного возраста 65 лет, проживающих в организациях социального обслуживания.*



Вакцина против пневмококковой инфекции хорошо переносится, вводится внутримышечно, является безопасной и формирует выраженный иммунный ответ.